

UND-Auswertungsbericht

Jahr 2024 - Arztfragebögen stationär

Leistungserbringer Klinikum Niederberg

Zuweiser Urologie Neanderthal und Dr. Axel Schindler

Grundgesamtheit

| | Anzahl |
|-------------------------|--------|
| Arzt-Fragebögen | 58 |
| Patienten-Fragebögen | 58 |
| Patienten-Rücklaufquote | 100% |

Allgemeine Angaben

Eingriffsart

| | Anteil |
|---------------|--------|
| Operation | 91,4% |
| Steintherapie | 8,6% |
| Chemotherapie | 0,0% |

Keine Angaben: 0,0%

Krankenkasse

| | Anteil |
|---------------|--------|
| Kassenpatient | 82,8% |
| Privatpatient | 17,2% |

Keine Angaben: 0,0%

Überweisung

| | Anteil |
|-----------------|--------|
| Eigener Patient | 0,0% |
| Ein-Zuweisung | 100,0% |

Keine Angaben: 0,0%

Diagnose

| | Anteil |
|--|--------|
| Einweisungsdiagnose gleich Entlassungsdiagnose | 96,6% |
| Einweisungsdiagnose nicht gleich Entlassungsdiagnose | 3,4% |

Keine Angaben: 0,0%

Am häufigsten vorkommende ICD10-Schlüssel

| ICD10-Schlüssel | Anzahl |
|---|--------|
| N40 Prostatahyperplasie | 19 |
| C61 Bösartige Neubildung der Prostata | 11 |
| C67.8 Bösartige Neubildung der Harnblase - mehrere Teilbereiche überlappend | 5 |
| N20.0 Nierenstein | 3 |
| C67.2 Bösartige Neubildung der Harnblase - Laterale Harnblasenwand | 3 |
| C67.9 Bösartige Neubildung der Harnblase - nicht näher bezeichnet | 3 |
| N43.3 Hydrozele, nicht näher bezeichnet | 3 |
| C64 Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | 2 |
| C67.0 Bösartige Neubildung der Harnblase - Trigonum vesicae | 2 |
| N20.1 Ureterstein | 2 |
| C67.4 Bösartige Neubildung der Harnblase - Hintere Harnblasenwand | 1 |
| D41.4 Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der Harnblase, Tumor der Harnblase ohne Angabe, ob gutartig oder bösartig | 1 |
| N13.1 Hydronephrose bei Ureterstriktur | 1 |
| N32.0 Blasenhalsostruktion | 1 |
| N47 Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose | 1 |

Therapie

Am häufigsten vorkommende ICPM-Schlüssel

| ICPM-Schlüssel | Anzahl |
|--|--------|
| 5-573.40 Operationen an der Harnblase: Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt | 15 |
| 5-601.0 Elektroresektion von Prostatagewebe | 11 |
| 5-601.1 Operationen an Prostata und Vesiculae seminales: Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion mit Trokarzystostomie | 9 |
| 5-604.42 Operationen an Prostata und Vesiculae seminales: Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch: Mit regionaler Lymphadenektomie | 4 |
| 5-604.52 Operationen an Prostata und Vesiculae seminales: Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch, gefäß- und nervenerhaltend: Mit regionaler Lymphadenektomie | 4 |
| 5-550.31 Operationen an der Niere: Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Ureterorenoskopisch | 3 |
| 5-611 Operation einer Hydrocele testis | 3 |
| 5-553.03 Teilresektion der Niere, laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch | 2 |
| 1-665 Diagnostische Ureterorenoskopie | 1 |
| 5-562.4 Entfernung eines Steines aus dem Harnleiter, ureterorenoskopisch | 1 |
| 5-576.61 Operationen an der Harnblase: Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie bei der Frau: Laparoskopisch | 1 |
| 5-640.2 Zirkumzision | 1 |
| 5-604.41 Operationen an Prostata und Vesiculae seminales: Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch: Ohne regionale Lymphadenektomie | 1 |
| 5-604.51 Operationen an Prostata und Vesiculae seminales: Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch, gefäß- und nervenerhaltend: Ohne regionale Lymphadenektomie | 1 |
| 8-137.10 Manipulationen am Harntrakt - Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife: Wechsel Transurethral | 1 |

Zuweisender Arzt

| | Anzahl |
|----------------------|--------|
| Urologie Neanderthal | 29 |
| Dr. Axel Schindler | 29 |

Operation

Intraoperative Komplikationen nach Clavien Dindo

| | 1 | 2 | 3A | 3B | 4A | 4B | 5 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Infektion | 1,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Nachblutung | 4,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Harnverhalt | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Drangsymptomatik | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Schmerz | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Fistel / Leckage | 4,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Obstipation | 4,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Kardiopulmonal | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Neurologisch | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Allergie | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Andere | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "Operation" (Mehrfachantworten möglich)

Keine Komplikationen: 89,5%

Andere intraoperative Komplikationen: keine

Postoperative Komplikationen nach Clavien Dindo

| | 1 | 2 | 3A | 3B | 4A | 4B | 5 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Infektion | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Nachblutung | 5,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Harnverhalt | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Drangsymptomatik | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Schmerz | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Fistel / Leckage | 1,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Obstipation | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Kardiopulmonal | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Neurologisch | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Allergie | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Andere | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "Operation" (Mehrfachantworten möglich)

Keine Komplikationen: 93,1%

Andere postoperative Komplikationen: keine

OP Ergebnis BPH Verfahren

| | Anteil |
|---------------|--------|
| TUR-P | 100,0% |
| Enukleation | 0,0% |
| Adenomektomie | 0,0% |
| Lasere | 0,0% |

Anteil an der Grundgesamtheit aller Fragebögen mit Eingriffsart "Operation" (ohne Fragebögen ohne Angaben; Mehrfachantworten möglich)

Zusammenfassende Beurteilung weiterbetreuender Arzt

| | Anteil |
|------------|--------|
| Gut | 94,8% |
| Akzeptabel | 5,2% |
| Schlecht | 0,0% |

(Wieder-) Einweisung Krankenhaus erforderlich: 1,7%

Stellungnahme zum OP-Ergebnis

Keine Nennungen